

Výskyt dávivého (černého) kašle – stále aktuální

V roce 2014 bylo na území ČR hlášeno 2518 případů onemocnění dávivým kašlem, což představuje nárůst oproti roku 2013 o 104%.

V Moravskoslezském kraji jsme zaznamenali 9 násobný nárůst nemocnosti oproti roku 2013, kdy nemocnost dosáhla 17,7 případů/100 tis. obyvatel. Nejvyšší nemocnost byla hlášena z okresu Frýdek-Místek a u osob starších 15 let.

S ohledem na skutečnost, že pokračuje výskyt tohoto onemocnění informujeme občany o epidemiologické situaci a příznacích onemocnění. V případě výskytu níže uvedených příznaků navštivte ošetřujícího lékaře, aby v případě potvrzení onemocnění mohla být včas nasazená antibiotická léčba a bylo zabráněno dalšímu šíření nákazy.

Černý neboli dávivý kašel (pertuse) je vysoce infekční onemocnění dýchacího traktu, který se typicky projevuje záchvaty kašle trvajících někdy i řadu týdnů. Záchvaty kašle jsou zpočátku suché a dráždivé (1-2 týdny), pak nastupuje období typického, dráždivého kašle se zájímáním a vykašláváním hlenů (1-2 měsíce i déle) a v posledním stadiu záchvaty kašle pomalu ustávají, jedná se o dobu rekonvalescence, která je poměrně dlouhá, trvá až několik týdnů. Záchvaty kašle mohou být provázeny zvracením, vysokou teplotou, celkovým vyčerpáním a ztrátou váhy.

Původcem onemocnění je bakterie *Bordetella pertusis*, kterou se můžeme nakazit kapénkami pouze od člověka, který právě prodělává akutní onemocnění. Inkubační doba je nejčastěji 7-10 dní.

K preventivním opatřením patří očkování, které se provádí u dětí v prvních měsících života kombinovanou očkovačí látkou. První přeočkování se aplikuje u dětí mezi pátým a šestým rokem dítěte a druhé přeočkování při dovršení desátého roku.

Udává se, že imunita proti černému kašli přibližně po 4 až 12 letech po očkování postupně vymizí. To znamená, že dospělí, kteří byli očkovaní v dětství nejsou již proti černému kašli chráněni.


V ČR jsou na trhu vakcíny, kterými se mohou očkovat všechny věkové kategorie jako prevence před onemocněním černým kašlem.

Očkování se doporučuje nastávajícím maminkám, zdravotníkům neonatologických a dětských oddělení, rodinným příslušníkům novorozenců, včetně starších sourozenců a prarodičů a dalších blízkých kontaktů novorozence s cílem ochrany neočkovaných či neúplně očkovaných novorozenců a kojenců.


Tabulka č. 1 Výskyt pertuse v MSK v letech 2010 -2014 (abs., rel.čísla)

Rok	Hlášeno případů	Relativní výskyt na 100 tis.
2010	37	3,0
2011	12	1,0
2012	44	3,6
2013	25	2,0
2014	216	17,7

Hlášené případy dávivého kašle v MSK v letech 2010 - 2014 dle okresů



Nemocnost dávivým kašlem v MSK a ČR v letech 2010 - 2014 - relativní počty na 100 000 obyvatel



Hlášené případy dávivého kašle v MSK a ČR v letech 2010 - 2014

